

190

Aus dem Pharmakologischen Institut in Giessen.

ÜBER DIE BINDUNG DES CHLOROFORMS IM BLUTE.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der

veterinär-medizinischen Doktorwürde

der

vereinigten medizinischen Fakultät

der

Grossherzoglich Hessischen Ludwigs-Universität zu Giessen

vorgelegt von

Hermann Sturhan

Oberveterinär aus Darmstadt.

Mit einer Abbildung.

GIESSEN 1907

Hof- und Universitäts-Druckerei, Otto Kindt, Giessen.

Aus dem Pharmakologischen Institut in Giessen.

ÜBER DIE BINDUNG DES CHLOROFORMS IM BLUTE.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der

veterinär-medizinischen Doktorwürde

der

vereinigten medizinischen Fakultät

der

Grossherzoglich Hessischen Ludwigs-Universität zu Giessen

vorgelegt von

Hermann Sturhan

Oberveterinär aus Darmstadt.

Mit einer Abbildung.

GIESSEN 1907

Hof- und Universitäts-Druckerei, Otto Kindt, Giessen.

Gedruckt mit Genehmigung der vereinigten medizinischen Fakultät
zu Giessen.

Referent: Prof. Dr. Geppert.

MEINEN ELTERN

GEWIDMET.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

Schmiedeberg hat zuerst bewiesen, daß sich Chloroform, das man dem Blute zusetzt, ungleichmäßig verteilt; der größere Teil haftet an den roten Blutkörperchen, der geringere am Serum, wie die Versuche am sedimentierten Blut ergaben. Daraus mußte gefolgert werden, daß die Bindung des Chloroforms im Blut nicht der eines Dampfes im Wasser gleicht, sondern daß hier noch eine spezifische Anziehung durch bestimmte chemische Stoffe anzunehmen ist. Hier kommen die Fette und fettartigen Substanzen (Cholesterin, Lecithin u. f. w.) in Betracht, von denen man weiß, daß sie Bestandteile der roten Blutkörperchen sind. Doch ist ein strikter Beweis für die Richtigkeit dieser Annahme bis jetzt noch nicht geliefert. Daher erschien eine genauere Untersuchung notwendig.

Zuerst mußte festgestellt werden, ob das Blut bei sonst gleichen Verhältnissen in der Tat mehr Chloroform aufzunehmen imstande ist als destilliertes Wasser. War diese Frage zu bejahen, so mußte untersucht werden, ob Lösungen der Blutkörperchen nach Extraktion der fettartigen Stoffe jetzt in der Tat keine andere Bindungsfähigkeit für Chloroform besäßen als Wasser. Es war demnach zunächst der Absorptionskoeffizient des Chloroformdampfes gegenüber Wasser und sodann gegenüber Blut resp. Lösungen von Cruor zu bestimmen. Die Vorbedingung für die Lösung einer solchen Aufgabe ist, daß man über Chloroformdampf von bestimmter Spannung, oder mit anderen Worten, über ein Gasgemisch verfügt, das eine bestimmte Chloroformmenge enthält. Mit diesem sättigt man die betreffende

Flüssigkeit bei bestimmter Temperatur ab, und analysiert dann den Chloroformgehalt derselben.

Der Apparat zur Erzeugung eines konstanten Gemisches von Chloroformdampf und Luft ist in den Arbeiten aus dem pharmakologischen Institut öfters beschrieben; zuletzt in der Arbeit von Dunker^{*)}). Wie aus der l. c. gegebenen Darstellung ersichtlich, entströmen dem Apparat ungefähr 20 l in der Minute, die einen ganz gleichmäßigen Chloroformgehalt haben und zwar bei meinen Versuchen 1,4—1,42 ‰. Um mit diesem Gemisch Wasser oder Blut abzufüttern, wird eine Spritzflasche mit der betreffenden Flüssigkeit gefüllt, und nun ein Zweigstrom aus dem Apparat vermittelt zweier communicierender Wasserflaschen in bekannter Weise durchgesaugt. Meine Saugflaschen hatten einen Inhalt von 4 l. Da während einer Stunde 6 mal die Flasche geleert wurde, passierten etwa 24 l Gas die Spritzflasche. Weil das Blut beim Durchströmen des Gases aufschäumte, wurde auf das ausführende Rohr der Spritzflasche ein etwa 50 cm hoher, mehrfach ampullenförmig erweiterter Glasauflaß gesetzt, aus dem der Schaum zurückfließen konnte. Während des Sättigens verdunstet Wasser. Um daher die zurückbleibende Flüssigkeitsmenge genau zu bestimmen, wurde die Flasche leer und am Ende des Versuchs gewogen. Die Differenz gibt die mit dem betreffenden Chloroformdampfgemisch gesättigte Flüssigkeitsmenge. — Es war nun ferner zu untersuchen, ob wirklich eine vollkommene Abfütterung der Flüssigkeit mit dem betreffenden Chloroformdampfgemisch eintrat. Zu dem Zweck setzt man in Kontrollversuchen der Flüssigkeit zunächst eine wesentlich größere Menge flüssigen Chloroforms zu, als man nach der Abfütterung erwarten darf, löst es sorgfältig, und leitet nun den Chloro-

^{*)} Dunker, „Über die Sättigung des Tierkörpers mit Chloroform während der Narkose“. Giessen 1907. Inaugural-Dissert.

formdampf der betreffenden Spannung wieder hindurch. Ergibt dann die Analyse das gleiche Resultat, wie bei der ersten Art der Ablättigung, so ist der Ab absorptionskoeffizient sicher bestimmt. Die Versuche wurden bei Körpertemperatur im Wasserbade angestellt. In der zu fättigenden Flüssigkeit befand sich ein Thermometer. Die Analyse der Flüssigkeit auf ihren Chloroformgehalt wurde in verschiedener Weise vorgenommen. Wasser wurde in gemessener Menge unter Zusatz von Alkohol und chlorfreier Natronlauge verseift, das Blut dagegen von Chloroform nach der im pharmakologischen Institut üblichen Methode befreit*) und das Chloroform bestimmt.

Wie oben auseinandergesetzt, sollte, nachdem der Ab absorptionskoeffizient des Wassers bestimmt war, untersucht werden, ob eine Lösung der roten Blutkörperchen im Wasser denselben Ab absorptionskoeffizienten zeigen würde, wenn ihr die fettartigen Stoffe entzogen wären. Der Sicherheit halber wurde dabei jedes Mal mitbestimmt, ob die Lösung der roten Blutkörperchen wirklich mehr Chloroform aufnimmt, als reines Wasser. Um die nötigen Lösungen der Blutkörperchen herzustellen, wurde das Blut zunächst mit der 9 fachen Menge 0,8% iger Kochsalzlösung verdünnt und zentrifugiert. Auf diese Weise erhält man die roten Blutkörperchen relativ rein im Sediment. Dann nimmt man das auf dem Serum stehende Fett zunächst mit Äther ab, und saugt die oben stehende Serum schicht fort. Die restierende Cruormenge löst man in einer gemessenen Quantität Wasser und teilt sie in 2 gleiche Teile. Den ersten fättigt man direkt mit Chloroformluft, den zweiten befreit man zuerst von den fettartigen Stoffen. Zu dem

*) Günter, „Der Chloroformgehalt von Blut, Leber und Niere während der Narkose“. Giessen 1906. Inaugural-Dissertation.

Zweck schüttelt man ihn mit gereinigtem Petrol-Äther (Siedepunkt bis 70° C.) aus, und läßt 2 Tage im Scheidetrichter absetzen. Hierauf wird die wässerige (untere) Schicht für sich abgezogen und von etwa darin haftendem Petroläther befreit. Zu dem Zweck wird zuerst zentrifugiert, und dann über die Oberfläche nur kräftiger Luftstrom geblasen. Zum Schluß wird dabei die Flüssigkeit noch schwach erwärmt. Am Ende verschwindet der Geruch nach Petroläther vollkommen, und nun wird die Menge der Flüssigkeit gemessen und sie selbst mit Chloroformdampf abgefättigt.

Zur Bestimmung des Chloroforms im Blut und Cruor wurde die schon von Günter l. c. beschriebene Methode verwandt. Nur wurde das Chloroform durch Paraffinum liquidum statt durch Olivenöl absorbiert. Der Vollständigkeit halber sei die so umgestaltete Methode noch einmal ausführlich auseinander gesetzt (s. die Abbildung). Das Prinzip ist folgendes:

Ein Luftstrom zirkuliert in einem geschlossenen Kreise vom Blute, das entgast werden soll, zum Paraffinum liquidum, und von diesem zum Blut zurück. Dabei belädt er sich jedesmal im Blut mit Chloroform und gibt es an das Paraffinum liquidum ab. Das Paraffin muß während des Betriebes mehrmals durch neues ersetzt werden, da sonst die Absorption keine vollkommene ist. Die Bewegung der Luft wird durch eine kleine Quecksilberpumpe bewirkt. Sie hat folgende Konstruktion: Ein breites T-Stück *C* aus Glasrohr ist an einem Stativ so befestigt, daß der untere Schenkel senkrecht, mit der Mündung nach unten steht. Er ist etwa 20 cm lang. Ein gläserner, etwas weiterer und mit Quecksilber gefüllter Zylinder *a* wird von unten über den senkrechten Schenkel des T-Stückes gezogen. Senkt man den Zylinder,

so wird Luft in das T-Stück eingefogen, hebt man ihn, dann wird sie ausgestoßen. Vor den beiden Mündungen des horizontalen Querschenkels befinden sich 2 Quecksilberventile, die die Luft von der einen Seite herein und nach der anderen heraustreten lassen. Vom Auslaßventil B geht eine Rohr- und Schlauch-Verbindung (k, l) zu dem Erlenmeierschen Kolben C, in dem sich die zu entgasende Flüssigkeit befindet. Die zirkulierende Luft tritt von oben in dieses Gefäß ein durch das Glasrohr l, das mit einem Stopfen fest eingefügt ist und fast bis auf den Boden des Gefäßes reicht; sie tritt aus durch ein seitliches Rohrstück, das zu einem U-Rohr D führt. Es hat den Zweck, übergehenden Schaum aufzufangen. Vom U-Rohr tritt die Luft in das Absorptionsrohr E ein, das mit Paraffin zum Teil gefüllt ist. Es bildet an der dem U-Rohr zugekehrten Seite einen nach oben konkaven Bogen, der dem Tisch aufliegt, während das andere Ende in die Höhe steigt, sodaß sich das Paraffin an der tiefsten Stelle sammelt. Durch ein Gummistück g ist es dann mit dem Einlaßventil der Pumpe verbunden. Der Erlenmeiersche Kolben C mit der zur Entgasung kommenden Flüssigkeit ist auf einem Gestell e befestigt, das mit einer horizontalen Achse fest verbunden ist und diese nach oben hin etwa 4 cm überragt. Von dieser Verlängerung geht eine Schnur f ziemlich wagerecht über eine Rolle c und steigt dann zur Quecksilberpumpe hinab, an deren Quecksilber-Zylinder sie befestigt ist. Die Achse ruht in 2 Lagern m und n, und wird in ihnen um etwa 90° hin und her gedreht. Die Methode dieser Drehung ist durch die Konstruktion o (Eisenstab, der in der Achse steckt mit Kette, die zum Excenter p führt) angedeutet, das Rad, das zum Excenter p gehört, wird durch einen Elektromotor getrieben. Ist das Ganze in Betrieb gesetzt, so pendelt der Kolben c mit der Flüssigkeit hin und her und die Pumpe geht auf und nieder. Bei meinen Versuchen machte die Pumpe in der Minute

44 Hübe. Das Paraffin in der Glasröhre hatte eine Länge von 15 cm. Es ist leicht, eine annähernde Berechnung aufzustellen, wieviel Luft unter diesen Bedingungen zirkuliert. Man braucht zu dem Zweck nur die Anzahl der Luftblasen im Paraffin zu zählen, und die Länge der Paraffinfläule bei Durchtritt der Luft zu bestimmen. Denn die Länge der Paraffinfläule gibt an, wieviel Luft jetzt im Paraffin enthalten ist, und aus dieser Ziffer, sowie aus der Zahl der Blasen ergibt sich die Größe jeder Blase. Angenommen z. B. es befänden sich 10 cm Paraffin in der Röhre, und nähmen ursprünglich 10 cm der Röhre ein, so würde sich bei Luftdurchtritt die Paraffinfläule auf 30 cm verlängern, und es würden demnach 20 cm Luft im Paraffin enthalten sein. Wenn sich nun 10 Luftblasen zu gleicher Zeit im Paraffin befinden, so würde jede Blase 2 cm Luft entsprechen. Passieren nun in der Minute 20 Blasen eine Stelle des Rohres, so beträgt der Luftdurchtritt 40 cm.

Zunächst untersuchte ich, ob sich das Chloroform im Paraffin genau bestimmen läßt. Die Bestimmung wurde in folgender Weise gemacht: Eine gemessene Menge Paraffinum liquidum wird in eine Flasche gegossen und mit einer genau abgewogenen Chloroformmenge vermischt. Das Zusetzen des Chloroforms geschieht in der Weise wie es schon früher in den Arbeiten aus dem pharmakologischen Institut beschrieben worden ist (s. Günter pag. 7). Ein dünnes, an einer Seite geschlossenes Kapillarröhrchen wird in Chloroform geworfen und nun das Chloroform abwechselnd erhitzt und abgekühlt. Dabei füllt sich das Röhrchen fast ganz. Die Differenz zwischen dem Gewicht des Röhrchens vor und nach der Füllung ergibt die Chloroformmenge. Alsdann wird das Röhrchen in das Paraffin geworfen, energisch zerstoßen und mit dem Paraffin ver-

mischt. Um das Chloroform im Paraffin zu bestimmen, wird es zunächst mit absolutem Alkohol daraus extrahiert. Zu dem Zwecke wird das Paraffin mit der doppelten Menge Alkohol geschüttelt und dann behufs schnelleren Absetzens zentrifugiert. Der Alkohol klärt sich dabei vollkommen, wird oben abgeseigt und die Prozedur dreimal wiederholt. Die Alkoholmengen werden vereint und mit 25 ccm 3%igen Natriumalkoholats am Rückflußkühler verfeist. Dann wird der Alkohol abdestilliert, der Rest mit Wasser verdünnt, schwach angesäuert und mit gereinigtem Petrol-Äther dreimal ausgeschüttelt, um das noch vorhandene Paraffin zu entfernen. Der Petrol-Äther wird mit Wasser gewaschen und dieses der ursprünglichen Flüssigkeit hinzugefügt. Alsdann wird zur vollständigen Verflüchtigung des Petrol-Äthers aufgeköcht. Zum Schluß wird mit chlorfreier Natronlauge gegen Lakmus und Phenolphthalein neutralisiert. Endlich wird unter Zusatz von Kaliumchromat mit $\frac{1}{10}$ Normal-Silbernitratlösung titriert. Entfernt man das Paraffin nicht aus der Flüssigkeit, so erhält man bei der Titrierung stets etwas zu kleine Werte.

Die Versuche gestalten sich im einzelnen folgendermaßen:

Zuerst überzeugte ich mich wie meine Vorgänger, wie genau sich Chloroform im Alkohol bestimmen ließ, wenn es im Kapillarröhrchen hineingetan ist.

1. Versuch.

Angewandtes Chloroform	0,0134
Gefundenes	„ 0,0132
Verlust:	0,0002

(3,3 ccm der $\frac{1}{10}$ Normal-Silbernitrat-Lösung.)

2. Versuch.

Angewandtes Chloroform	0,0243
Gefundenes	„ <u>0,0236</u>
Verluft:	0,0007

(5,9 ccm der $\frac{1}{10}$ N.-L.)

3. Versuch.

Angewandtes Chloroform	0,0105
Gefundenes	„ <u>0,0100</u>
Verluft:	0,0005

(2,5 ccm der $\frac{1}{10}$ N.-L.)

4. Versuch.

Angewandtes Chloroform	0,0329
Gefundenes	„ <u>0,0320</u>
Verluft:	0,0009

(8 ccm der $\frac{1}{10}$ N.-L.)

Auch diese Resultate beweisen, daß das Chloroform auf diese Weise genau bestimmt wird.

Nunmehr wurden Versuche angestellt über den Nachweis des Chloroforms in Paraffinum liquidum. Bei den ersten, unvollkommenen Versuchen wurde das Paraffin nicht vollständig vor der Titrierung entfernt, da die Ausschüttelung mit Petrol-Äther unterblieb. Es wurden verwandt 40 ccm Paraffin; dreimal wurde mit je 80 ccm Alkohol geschüttelt und ebenso oft 10 Minuten lang zentrifugiert.

5. Versuch.

Angewandtes Chloroform	0,0254
Gefundenes	„ <u>0,0244</u>
Verluft:	0,001

(6,1 ccm der $\frac{1}{10}$ N.-L.)

6. Versuch.

Angewandtes Chloroform	0,0241
Gefundenes „	0,022
Verluft:	0,0021

(5,5 ccm der $\frac{1}{10}$ N.-L.)

7. Versuch.

Angewandtes Chloroform	0,0072
Gefundenes „	0,0066
Verluft:	0,0006

(1,65 ccm der $\frac{1}{10}$ N.-L.)

In den folgenden Versuchen wurde nach der oben beschriebenen Methode verfahren, und das Paraffin ganz mit Petrol-Äther entfernt.

8. Versuch.

Angewandtes Chloroform	0,03
Gefundenes „	0,0298
Verluft:	0,0002

(7,45 ccm der $\frac{1}{10}$ N.-L.)

9. Versuch.

Angewandtes Chloroform	0,0306
Gefundenes „	0,0306
Verluft:	0

(7,65 ccm der $\frac{1}{10}$ N.-L.)

Wie aus den Versuchen hervorgeht, kann man alles Chloroform im Paraffin nach diesen Methoden bestimmen.

Um weiterhin nachzuweisen, daß im eben beschriebenen Apparat vom Paraffin der Chloroformdampf quantitativ aufgenommen wird, wurde destilliertes Wasser, das mit einer bestimmten Chloroformmenge versetzt war, entgast und das Chloroform nachher bestimmt.

Die Versuche gestalteten sich folgendermaßen:

1. Versuch.

Etwa 150 ccm Wasser werden in einen Erlenmeierschen Kolben von etwa 640 ccm Inhalt gefüllt und diesem dann die mit Chloroform gefüllte Kapillare zugefügt und im Wasser zerstoßen. Während des Versuches wird das Paraffin etwa alle 2 Stunden gewechselt, sodaß bei viermaligem Wechsel 40 ccm Paraffin resultieren. Die 4 Paraffinvorlagen werden gemeinsam analysiert.

Angewandtes Chloroform	0,02
Gefundenes	„ 0,0188
Verluft:	<u>0,0012</u>

(4,7 ccm der $\frac{1}{10}$ N.-L.)

Eine 5. Paraffinvorlage ergab nach 3 stündigem Durchleiten kein Chloroform mehr.

2. Versuch.

Angewandtes Chloroform	0,0209
Gefundenes	„ 0,0200
Verluft:	<u>0,0009</u>

(5,0 ccm der N.-L.)

Auf diese Weise war festgestellt, daß sich alles dem Wasser zugelegte Chloroform wieder finden ließ.

Bei diesen Versuchen zeigt es sich, daß die Bestimmung des Chloroforms im Paraffin der im Olivenöl überlegen ist, da man

1. keine Veraschung nötig hat,
2. die Titrierumfhläge leichter erkennen kann als bei der früheren Bestimmung.

Meine weiteren Untersuchungen bezweckten, zunächst den Absorptionskoeffizienten des Wassers gegen Chloroformdampf von bestimmter Spannung festzustellen. Die Versuche wurden in der oben geschilderten Weise ange-

stellt. Es wurde in einem Kolben Wasser durch Durchleiten von Chloroformdampf von 1,4%o gesättigt. Der Kolben stand in einem Wasserbade von 10° C. und später von 37° C. Im Wasser befand sich während der Abfättigung ein Thermometer. Während des Versuches wurde die Temperatur konstant erhalten. Nach Beendigung der Durchleitung wurde, während der Kolben noch im Wasserbade stand, die Temperatur seines Inhalts gemessen. Ferner wurden mit einer Pipette 25 ccm Wasser entnommen und in ein bereit stehendes Gefäß gefüllt, welches bereits den zur Verseifung dienenden Alkohol (100 ccm) und 25 ccm 3%iges Natronalkoholat enthielt. Hierbei wurde beachtet, daß die Ausflußöffnung der Pipette sich bei der Entleerung unter dem Niveau der alkoholischen Flüssigkeit befand, sodaß das Chloroformwasser gar nicht mit der Luft in Berührung kam und kein Chloroform verdunsten konnte. Darauf wurde verseift, und das Chloroform bestimmt, wie oben angegeben. — Zur Kontrolle wurde dann von vornherein im Wasser eine größere, flüssige Chloroformmenge gelöst und im übrigen verfahren, wie oben beschrieben. Dabei verminderte sich der Chloroformgehalt des Wassers und mußte sich mit den früheren Bestimmungen decken.

Im einzelnen gestalten sich die Versuche folgendermaßen:

1. Versuch.

Nach $\frac{1}{4}$ stündigem Durchleiten des 1,4%o Chloroformdampfes durch Wasser von 10° C. ergab die entnommene Probe von 25 ccm einen Chloroformgehalt von 0,022 g (5,5 ccm der $\frac{1}{10}$ N.-L.) = 0,088%o.

2. Versuch.

Nach 18 Minuten langem Durchleiten bei 36° C. ergaben die entnommenen 25 ccm Wasser einen Chloroformgehalt von 0,006 g (1,5 ccm der $\frac{1}{10}$ N.-L.) = 0,024%o.

3. Versuch.

Es wurden 0,017 g flüssiges Chloroform 30 ccm Wasser in der oben beschriebenen Weise zugefügt, und durch dieses Chloroformwasser bei 37° C. 20 Minuten lang Chloroformdampf hindurchgeleitet. Die Analyse der entnommenen 25 ccm Wasser ergab einen Chloroformgehalt von 0,0056 g (1,4 ccm der $\frac{1}{10}$ N.-L.) = 0,0224‰.

4. Versuch.

Nach halbstündigem Durchleiten des 1,4‰ Chloroformdampfes durch Wasser von 37,3° C. ergab die Analyse 0,0055 g Chloroform (1,375 ccm der $\frac{1}{10}$ N.-L.) = 0,022‰.

Es ergibt sich aus diesen Versuchen, daß 100 ccm Wasser bei Sättigung mit 1,4‰ Chloroformdampf aufnehmen

bei 10 ° C.	0,088 ‰ Chl.
„ 36 ° „	0,024 ‰ „
„ 37 ° „	0,0224 ‰ „
„ 37,3° „	0,022 ‰ „

Weiter war zu untersuchen:

1. Wie viel Chloroformdampf nimmt eine bestimmte Menge Blut bei Sättigung mit 1,4‰ Chloroformgemisch auf,
2. wie viel nehmen die Blutkörperchen deselben Blutes auf,
3. wie viel nehmen die entfetteten Blutkörperchen auf?

Für die Lösung der 2. Frage, wieviel Chloroform die Blutkörperchen aufnehmen, ist folgende Überlegung anzustellen: Die Blutkörperchen werden nach dem Zentrifugieren im Wasser gelöst. Wird diese Lösung nun mit Chloroformdampf abgefättigt, so muß man nach dem Gesamtgewicht zunächst berechnen, wieviel Chloroform dieselbe Menge

Wasser absorbieren würde, und muß diese Ziffer von der Gesamtaborption abziehen, um die Bindung durch die roten Blutkörperchen zu berechnen. Angenommen z. B. es wären 100 g. Lösung mit Chloroformdampf von 1,4% abgefättigt, und enthielten 0,040 g. Chloroform, so würden 100 g Wasser nur 0,022 g enthalten. Demnach würden enthalten die roten Blutkörperchen: $0,040 - 0,022 = 0,018$ g. Es ist zuzugeben, daß diese Rechnung einen kleinen Fehler hat. Denn die 100 g Lösung bestehen aus Wasser und festen Stoffen; und man dürfte eigentlich nur die Absorption des Wassers in Anrechnung bringen, während hier die ganze Lösung als Wasser betrachtet wird. Aber die Menge der festen Stoffe ist eine so geringe, daß sie im vorliegenden Fall vernachlässigt werden kann. — Die über die Wasserbindung hinausgehende Chloroformaufnahme von Blut oder Cruor nenne ich die „spezifische Bindung“. Die Versuche gestalten sich folgendermaßen:

5. Versuch.

Pferdeblut (spezifisches Gewicht 1066). 50 ccm werden mit 0,8%iger NaCl.-Lösung auf das 10fache verdünnt und zentrifugiert; das oben aufliegende Fett wird mit Äther abgenommen und das Serum abgefogen. Der Cruor wird mit 50 ccm Wasser verdünnt. Die Gesamtflüssigkeit nach einstündigem Durchleiten des Chloroformdampfes bei $36,5^{\circ}$ C. beträgt noch 65 ccm. Die Entgasung ergibt 0,038 g Chloroform. 65 ccm Wasser würden bei $36,5^{\circ}$ C. enthalten: 0,015 g Chloroform. Demnach enthält der Cruor von 50 ccm Blut $= 0,023$ g, also von 100 ccm Blut bei 36° C. $0,046\%$ Chloroform, gefättigt mit $1,4\%$ Chloroformdampf.

6. Versuch.

Rinderblut (spezifisches Gewicht 1044). a) Cruor (entsprechend 50 ccm Blut) in der oben beschriebenen Weise durch neunfache Verdünnung mit 0,8%iger Kochsalzlösung und Zentrifugieren gewonnen, wird mit 100 ccm Wasser

verdünnt. Die Gesamtmenge beträgt nach 55 Minuten dauerndem Durchleiten des Chloroformgases bei 38° C. noch 119 g. Die Entgäfung dauert 8 Stunden mit viermaligem Paraffinwechsel.

Die Analyse ergibt: 0,0482 g Chloroform. 119 g Wasser würden binden 0,025 g Chloroform. Demnach beträgt die spezifische Bindung von Cruor, entsprechend 50 ccm Blut = 0,023. Es bindet also der Cruor von 100 ccm Blut = 0,046 g.

b) Ein Kontrollversuch unter denselben Voraussetzungen ergibt bei $37,5^{\circ}$ C. und $\frac{3}{4}$ stündigem Durchleiten von Chloroformgas in 100 g Gesamtflüssigkeit 0,047 g Chloroform. 110 ccm Wasser würden binden 0,024 g Chloroform. Demnach bindet der Cruor von 50 ccm Blut 0,023 Chloroform, und von 100 ccm Blut 0,046 $\frac{0}{10}$.

c) 50 ccm Blut werden mit der neunfachen Menge 0,8 $\frac{0}{10}$ iger Kochsalzlösung verdünnt und zentrifugiert, das oben schwimmende Fett durch Äther entfernt. Nach Abfugen des oben stehenden Plasmas wird der Cruor mit 200 ccm Wasser verdünnt, mit 200 ccm Petrol-Äther im Scheidetrichter geschüttelt und ablesen gelassen. Nach 24 Stunden wird die untere wässrige Flüssigkeit nochmals mit 200 ccm Petrol-Äther geschüttelt und die Gesamtmenge der abgesetzten Flüssigkeit — 180 ccm — zentrifugiert, durch gelindes Erwärmen und Schütteln vom etwa vorhandenen Petrol-Äther befreit. Hierbei erreicht die Flüssigkeit einmal eine Temperatur von 57° C. Dann wird abgefättigt mit 1,4 $\frac{0}{10}$ Chloroformdampf bei 37° C. Es wird in der bekannten Weise entgast.

Die Analyse ergibt 0,0472 g.

Bei der 5. Paraffinvorlage ist die Flüssigkeit auf 40° C. eine Stunde lang erwärmt. Doch ergibt die Analyse, daß kein Chloroform mehr abgegeben ist.

In 180 g Wasser würden enthalten sein 0,04 g Chloro-

form. Demnach beträgt die spezifische Bindung noch 0,007 g $\equiv$ 0,014 ‰, aus Cruor auf 100 ccm Blut bezogen.

7. Versuch.

Kälberblut (spezifisches Gewicht 1049). 50 ccm Vollblut werden 55 Minuten lang bei 38° Erwärmung von 28 l des konstanten Chloroformdampfes durchströmt. Vor der Entgafung hat das Blut noch ein Gewicht von 50 g $\equiv$ 48 ccm.

Die Analyse ergibt: 0,0318 g Chloroform $\equiv$ 0,0636 ‰. Die 5. Vorlage ist bei konstanter Erwärmung des Blutes auf 40° C. 3 Stunden lang entgast, ohne bei der Analyse Spuren von Chloroform zu zeigen. Ein Kontrollversuch mit einstündiger Durchströmung des Chloroformgases bei 37° C. Erwärmung ergibt bei der Entgafung in 50 ccm Vollblut 0,0364 g Chloroform $\equiv$ 0,0728 ‰.

Danach beträgt die spezifische Bindung des Blutes bei 37° C. im Mittel beider Versuche 0,068 — 0,023 $\equiv$ 0,045 ‰ Chloroform.

Von 50 ccm deselben Blutes wird der Cruor in der bekannten Weise abzentrifugiert und entfettet, dann durch etwa einstündiges Erwärmen und Schütteln des etwa ihnen anhaftenden Petrol-Äthers beraubt. Es wird $\frac{5}{4}$ Stunden lang bei Erwärmung auf 36° Chloroformgas durchgeleitet. Die 9stündige Entgafung der 150 g wiegenden Flüssigkeit ergibt bei viermaligem Paraffinwechsel 0,0392 g. Auch hier zeigt die 5. Paraffinvorlage kein Chloroform mehr.

150 ccm Wasser binden bei 36° C. 0,036 g Chloroform. Demnach beträgt die Bindung des entfetteten Cruors von 50 ccm Blut 0,039 — 0,036 $\equiv$ 0,003 $\equiv$ 0,006 ‰ Chloroform.

8. Versuch.

Rinderblut (spezifisches Gewicht 1039). a) 50 ccm Vollblut. Wegen der starken Schaumbildung wird das Chloroformgas nicht durchgeleitet, sondern das Blut wird bei 37,6° C. geschüttelt, während ein konstanter Chloroformstrom

$\frac{5}{4}$ Stunde lang darüber hinweg streicht. Die Analyse ergibt nach 8 stündiger Entgasung bei viermaligem Paraffinwechsel 0,0324 g Chloroform in 50 ccm Blut = 0,0648 ‰. Demnach beträgt die spezifische Bindung des Blutes 0,065 — 0,022 = 0,043 ‰ Chloroform.

In der 5. Vorlage findet sich kein Chloroform mehr, auch nicht in der 6., bei der das Blut 2 Stunden lang auf 42° C. erwärmt ist.

b) Cruor (50 ccm Blut entsprechend) in der bekannten Weise durch Verdünnung mit der neunfachen Menge einer 0,8 ‰igen Kochsalzlösung und durch Zentrifugieren gewonnen, wird mit 100 ccm Wasser verdünnt. Durch die auf 39,5° C. erwärmte Flüssigkeit wird 95 Minuten lang Chloroformgas geleitet. Gewicht der Flüssigkeit 114 g. Nach 9 stündiger Entgasung ergibt die Analyse 0,034 g.

114 g Wasser würden bei 39,5° C. enthalten 0,023 g Chloroform. Demnach beträgt die spezifische Bindung des Cruors 0,034 — 0,023 = 0,011 = 0,022 ‰ auf Cruor von 100 ccm Blut bezogen.

Ein zweiter Versuch wurde unter denselben Voraussetzungen gemacht; nur wurde der Cruor mit 125 ccm Wasser verdünnt. Die 138 g wiegende Flüssigkeit ergibt nach 8 stündiger Entgasung 0,0344 g. 138 ccm Wasser würden enthalten 0,028 g Chloroform. Demnach beträgt die spezifische Bindung 0,013 ‰.

c) Cruor (55 ccm Blut entsprechend) wird nach Verdünnung mit 200 ccm Wasser 2 mal mit je 200 ccm Petrol-Äther geschüttelt und im Scheidetrichter absetzen gelassen. Entfernen des Petrol-Äthers durch einstündiges Erwärmen, Schütteln und Durchleiten von Luft. Das Durchleiten des Chloroformgases dauert $\frac{5}{4}$ Stunden, wobei die Flüssigkeit auf 39° C. erwärmt ist. Zur Entgasung kommt eine Flüssigkeitsmenge von 192 g, welche bei der Analyse 0,0392 g Chloroform enthalten.

192 g Wasser würden enthalten 0,042 g Chloroform.

Demnach würde in diesem Versuch die spezifische Bindung nach Entfettung = 0 sein.

Eine Kontrollprobe mit entfettetem Blut ergab nach 9 stündiger Entgasung in 150 g Flüssigkeit 0,0358 g Chloroform.

150 g Flüssigkeit würden 0,033 g Chloroform enthalten. Demnach wäre die spezifische Bindung des entfetteten Cruors aus 100 ccm Blut = 0,006 ‰.

9. Versuch.

Rinderblut (spezifisches Gewicht 1054).

Über 50 ccm Vollblut wird $\frac{5}{4}$ Stunden lang Chloroformgas geleitet. Das Blut, das auf 38,5° C. erwärmt ist, wird während des Durchleitens des Chloroformgases dauernd geschüttelt. Nach 8 stündiger Entgasung ergibt die Analyse 0,032 g Chloroform = 0,064 ‰. Demnach beträgt die spezifische Bindung 0,043 ‰.

Von demselben Blut wird der aus 50 ccm gewonnene Cruor mit 125 ccm Wasser verdünnt. Beim einstündigen Durchleiten des Chloroformgases unter Erwärmung auf 40° C. werden 14 g verschüttet, sodaß 134 g zur Entgasung kommen. Die Analyse ergibt 0,044 g Chloroform. In 134 g Wasser würden enthalten sein 0,027 g Chloroform, sodaß auf den Cruor 0,017 g = 0,038 ‰ kämen.

Die 3. Probe von 50 ccm Blut wird in der bekannten Weise zentrifugiert, der Cruor verdünnt, entfettet und dann, wie oben beschrieben, durch Schütteln, Erwärmen und durch Durchleiten von Luft ihres Petrol-Äthers beraubt. Zur Entgasung kommen 168 g Flüssigkeit durch die 55 Minuten lang bei Erwärmung auf 40° C. Chloroformgas geleitet wird. Nach viermaligem Wechsel der Paraffinvorlage ergibt die Analyse 0,0328 g Chloroform.

168 g Flüssigkeit würden bei 40° C. aufnehmen an Chloroform: 0,034 g. Demnach band der Cruor kein Chloroform mehr.

Die folgende Tabelle gibt die spezifische Bindung, wie sie aus den vorhergehenden Versuchen folgt, wieder:

Tabelle der spezifischen Bindungen bei Körpertemperatur für eine Spannung des Chloroformdampfes von $1,4^{\circ}$ bei atmosphärischem Drucke.

Ver- such Nr.	Tierart	Spezifische Chloroformbindung *)			Spezifisches Gewicht **) des Blutes
		in 100 cem Blut	in Cruor von 100 cem Blut	in entfette- tem Cruor von 100 cem Blut	
5	Pferd		0,046		1066
6	Rind		0,046 0,046	0,014	1044
7	Kalb	0,040 0,050		0,006	1049
8	Rind	0,043	0,022 0,013	0,000 0,006	1039
9	Rind	0,043	0,038	0,000	1054

Die Tabelle ergibt zunächst, daß die untersuchten Blutarten in ihrem spezifischen Bindungsvermögen nicht sehr verschieden sind, trotzdem sie von verschiedenen Tieren stammen und verschiedene spezifische Gewichte haben. Weiterhin ergibt sich, daß dem Cruor durch Ausschütteln mit Petrol-Äther in der Tat die Fähigkeit genommen wird, Chloroform zu binden. Die geringen Werte, die einige- mal gefunden sind, erklären sich aus der Schwierigkeit, den Cruor vollkommen zu entfetten. Eigenartig gestaltet

*) Die spezifische Chloroformbindung ist, wie oben definiert diejenige Chloroformmenge, welche von den in der betreffenden Flüssigkeit enthaltenen fettartigen Stoffen bewirkt wird; die Bindung durch das Wasser ist demnach nicht einbezogen.

**) Die Bestimmung des spezifischen Gewichts bezieht sich auf eine Temperatur von 18° C. und wurde im Piknometer ausgeführt.

sich ferner die spezifische Bindung des nicht entfetteten Cruors. Die Zahlen wechseln hier außerordentlich, zwischen 0,013 und 0,046. Hier ist nun daran zu erinnern, daß der Cruor in der Art hergestellt wurde, daß das Blut zunächst mit dem 9fachen einer 0,8%igen Kochsalzlösung verdünnt wurde, ehe es in die Zentrifuge kam. Offenbar ist die Menge der Stoffe, die dabei den Blutkörperchen entzogen werden, bei den verschiedenen Blutarten eine sehr verschiedene, und so erklären sich die großen Zahlendifferenzen wohl am einfachsten durch die Annahme, daß die Bindung dieser Stoffe an die roten Blutkörperchen in den verschiedenen Blutarten eine verschiedene ist.

In den bisher angegebenen Versuchen ist nachgewiesen, daß es, durch Petrol-Äther extrahierbare, Körper sind, welche die spezifische Bindung des Blutes bedingen. Dieses Resultat hat bei näherer Betrachtung etwas auffallendes, denn es ist bekannt, daß fetten Körpern, wie Öl etc. Chloroform nur sehr schwer zu entziehen ist, während dies beim Blut mit Leichtigkeit — nämlich durch einen Luftstrom — möglich ist. Die Betrachtung leitet auf die Folgerung, daß es offenbar unter bestimmten Umständen möglich sein muß, den Fetten etwaiges, in ihnen gelöstes Chloroform leicht zu entziehen. Am nächsten lag die Idee, daß dies bei einer feinen Fettemulsion gehen würde, denn hier ist die Oberfläche für Abgabe von Chloroform eine sehr große. Daher wurden zunächst folgende Versuche angestellt: Fett (Olivenöl) in gemessener Menge wurde in einer 0,1%igen, abgemessenen Sodalösung sorgfältig emulgiert. Dann wurde durch die Emulsion eine Stunde lang Chloroformdampf von 1,4% Spannung bei konstanter Temperatur hindurchgeleitet. Darauf wurden mit der Pipette 25 ccm abgefoßen und der Chloroformgehalt durch Verseifung mit überschüssiger chlorefreier Natronlauge und

durch Veraschung des Olivenöls bestimmt. Der Rest, 100 ccm wurde im Apparat vom Chloroformdampf befreit.

Die Versuche gestalten sich folgendermaßen:

1. Versuch.

125 ccm einer 0,1^oigen Sodalösung werden mit 0,25 g Olivenöl geschüttelt, sodaß eine feine milchartige Emulsion resultiert. Nachdem 50 Minuten lang der konstante Chloroformgasstrom (1,4^o „) durch die auf 36° C. im Wasserbade erwärmte Emulsion geleitet ist, werden 25 ccm mit der Pipette abgelesen und mit 30 ccm Natriumalkoholat und 100 ccm absolutem Alkohol 2¹/₂ Stunde lang verseift, eingedampft und verascht. Die Asche wird alsdann in destilliertem Wasser gelöst, schwach angeäuert und filtriert. Zur Entfernung der Kohlenäure wird aufgekocht, gegen Phenolphthalein und Lakmuspapier neutralisiert und titriert.

Die Analyse ergibt in den 25 ccm 0,010 g Chloroform = 0,040^o/_o.

Der Rest der Emulsion, 100 ccm, wird 8 Stunden lang bei 40° C. Erwärmung entgast bei 4maligem Paraffinwechsel und ergibt bei der Analyse 0,0384 g Chloroform = 0,0384^o/_o. Eine 5. Paraffinvorlage weist keine Spur von Chloroform mehr auf.

Bei so geringen Ölmengen und guten Emulsion ist demnach eine vollkommene Entgastung in der Tat möglich. Ein ähnliches Resultat ergibt auch folgender Versuch mit größeren Ölmengen.

2. Versuch.

125 ccm einer 0,1^oigen Sodalösung werden mit 0,475 g Olivenöl geschüttelt. Von dieser 0,3^o/_o Fettemulsion werden 25 ccm nach einstündigem Durchleiten des Chloroformgases bei 36,6° C. Erwärmung direkt verseift und verascht. Die Analyse ergibt 0,0072 Chloroform = 0,0288^o/_o.

Der Rest (100 ccm) wird 8 Stunden lang unter kon-

stanter Erwärmung auf 40°C . bei 4 maligem Paraffinwechsel entgast. Die Analyse ergibt einen Chloroformgehalt von $0,0337\text{ g} = 0,0337\%$.

Die 5. und 6. Paraffinvorlage ergaben nach 5 stündigem Entgasen kein Chloroform mehr.

Die Differenz beider Bestimmungen in diesem Versuch ($0,005\%$) ist nicht sehr groß, und da die Veraschung den kleineren Wert ergab, so ist wohl eine geringe Ungenauigkeit die wahrscheinliche Ursache. Denn ein Bestimmungsfehler von $0,001\text{ g}$ Chloroform bei der Veraschung wie er wohl vorkommen kann, erklärt das Resultat vollkommen. Als ich aber bei gleicher Versuchsanordnung dann eine 1% ige Öllösung verwandte, erhielt ich viel schlechter stimmende Zahlen, nämlich durch Verseifung $0,0448\%$ und durch Entgasung $0,0347\%$.

Vielleicht stammt die Differenz daher, daß eine so große Ölmenge schwer ganz gleichmäßig zu emulgieren ist. Denn als ich mit einer schlecht emulgierten Lösung die Versuche wiederholte, erhielt ich noch viel schlechter stimmende Resultate. Ich emulgierte nämlich eine $0,1\%$ ige Mischung von Öl in Wasser durch Schütteln, fättigte mit $1,4\%$ igem Chloroformdampf ab und erhielt $0,0204\text{ g}$ Chloroform in 100 ccm , d. i. eine Menge, wie sie von 100 ccm Wasser allein absorbiert wird. Bei einem 2. gleichen Versuch ergab die Verseifung von 25 ccm einer $0,162\%$ Fett-Emulsion $0,0252\text{ g}$ Chloroform $= 0,1008\%$. Die Entgasung von 100 ccm derselben Emulsion nur $0,0192\%$. Bei diesem Versuch waren 25 ccm der obenauf schwimmenden Schicht zur Verseifung, der Rest 100 ccm zur Entgasung im Apparat gebraucht, jene enthält als ölreicherer Teil selbstverständlich auch mehr Chloroform als diese. Ich habe diese Fragen nicht weiter untersucht, da so große Mengen Fett, resp. so schlechte Emulsionen im Blut nicht vorkommen.


Fasse ich das Hauptresultat meiner Arbeit kurz zusammen, so ergibt sich: Durch Entfettung mittels

Petrol-Äthers läßt sich den Blutkörperchen ihre Fähigkeit, Chloroform zu binden, entziehen.

Zum Schluß gestatte ich mir, Herrn Prof. Geppert meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

Erklärung der Abbildung.

- A.* Quecksilberpumpe.
- B.* Quecksilberventil leitet die Luft von der Pumpe zu *C*.
- C.* Erlenmeyerscher Kolben, in dem sich die zu entgasende Flüssigkeit befindet.
- D.* U-Rohr zum Auffangen des Schaumes.
- E.* Glasrohr, in dem sich das Paraffin befindet.
- F.* Quecksilberventil, das die Luft zur Pumpe führt.
 - a.* Zylinder, teilweise mit Quecksilber gefüllt, geht auf und nieder; die punktierten Linien geben die tiefste Stellung an.
 - b.* T-Stück an einem Stativ befestigt.
 - c.* Rolle, über die die Schnur von *d* nach *e* läuft
 - d.* Ein Eisenstück mit 2 Ösen, an die mit 2 Bindfäden der Zylinder *a* befestigt ist.
 - e.* Gestell, auf dem der Erlenmeier befestigt ist und das an die Achse *i* festgeschraubt ist.
- g.* *g*₁, *g*₂ u. s. w. Verbindungen durch Gummischläuche.
- h.* Eisenstab, an der Achse befestigt.
- i.* Achse.
- k. l.* Glasröhren, zur Verbindung des Ventils mit dem Erlenmeier.
- m. n.* Achsenlager.
 - o.* Verbindungskette von *h* mit dem Excenter *p*.
Die Pfeile deuten die Richtung des Luftstroms an.



Lebenslauf.

Am 22. Mai 1873 wurde ich, Hermann Heinrich Wilhelm Sturhan, zu Dielingen (Westfalen) geboren. Von Ostern 1878 bis Ostern 1883 besuchte ich die Elementarschule meines Heimatsortes, darauf bis 1888 die Selektta der Bürgerschule zu Lübbecke i. W., um dann das Gymnasium in Minden zu beziehen. Von dieser Anstalt ging ich am 5. März 1892 mit dem Zeugnis der Reife ab. Vom 1. Oktober 1892 bis 1. Oktober 1893 stand ich als Roßarztaspirant beim 8. Hufaren-Regiment, um von dort auf ein Jahr zur Lehrschmiede Berlin kommandiert zu werden. Vom Oktober 1894 studierte ich in Berlin als Militär-Studierender Tierheilkunde, bestand im April 1896 das tentamen physicum und unterzog mich mit Erfolg im Sommer 1898 der Fachprüfung. Als Unter-Roßarzt wurde ich ins 4. Ulanen-Regiment nach Thorn versetzt, als Ober-veterinär am 1. Oktober 1903 zur Milit.-Veterinär-Akademie auf ein Jahr kommandiert und im Jahre 1904 in das Leibdragoner-Regiment Nr. 24 in Darmstadt versetzt, wo ich mich gegenwärtig noch befinde.
